




**水稻の害虫！
トビイロウンカ発生！**



中山間向けパンフレット

トビイロウンカ対策は出来ていますか？

移植時 「フルスロトル箱粒剤」や「スクラム箱粒剤」などトリフルメゾピリムを有効成分に含む箱粒剤を

使っていない

使っている

※以下の使用薬剤例を参考に防除してください。

6月中旬
薬剤散布

薬剤例
トレボン乳剤
(いもち防除と兼ねる場合は、コラトップトレボン粒剤)

出穂前
薬剤散布

時期と薬剤は
防除情報を確認

必ず行う
基幹防除

出穂前
薬剤散布

時期と薬剤は
防除情報を確認

薬剤例
スタークル粒剤
(穂いもちと斑点米カメムシ防除を兼ねる場合はゴウケツモンスター粒剤出穂10日前)
※液剤使用の場合は、株もとまでかかるよう散布する。

収穫前

発生していたら
すぐに薬剤散布

薬剤は
防除情報を確認

発生を観察
追加防除

収穫前

発生していたら
すぐに薬剤散布

薬剤は
防除情報を確認

薬剤例
スタークル粒剤
(斑点米カメムシ防除を兼ねる対応)

※防除情報は下記の問い合わせ先から確認できます。
また、右記のQRコード(県病害虫防除所HP)からも確認できます。



- ・農薬の使用時は、ラベルに記載された内容を確認し、ラベルどおりに使用して下さい。
- ・水面施用剤やなげこみ剤を使用する場合は止水期間を遵守して下さい。
- ・ほ場周辺への飛散防止に努めて下さい。

パンフレット・防除情報に関する問合せ

東部農林振興事務所 農業振興課

電話番号0745-82-3248