

病虫害情報

オオタバコガの飛来量が急増しました

奈良防号外
令和7年7月14日

関係機関長 殿
病虫害防除員 殿
調査員・情報員 殿
農業資材販売等関係者 殿

奈良県病虫害防除所長

病虫害情報の送付について

このことについて、以下の通り発表しました。生産者に対する注意喚起をお願いします。

令和7年度病虫害情報第2号

病虫害名：オオタバコガ

作物名：野菜・花き類

対象地域：奈良県全域 発生時期：平年並 発生量：多い

1. 飛来と発生の状況

- 性フェロモントラップ（奈良県桜井市）の調査では越冬世代の多飛来に続き、第1世代成虫の飛来量が急増しています。6月第6半旬より多発年を大きく上回る誘殺が確認されています（図）。
- 一部は場での多発も確認されており、今後も多飛来した成虫による産卵とふ化幼虫による食害が想定されます。
- 近畿地方の3ヶ月予報（6月24日発表）では、7月～9月の気温は平年より高いと予想されています。
- 今年度のフェロモントラップ誘殺データを病虫害防除所/奈良県公式ホームページに随時掲載しますのでご覧下さい。

2 防除上の注意事項

- オオタバコガは成虫が夜間に飛来し、新葉や蕾に1卵ずつ産みつけます。ふ化幼虫は、新葉や蕾から食害を始め、発育が進むと果実（ナス、トマト）、茎（トマト）、新芽（キク）や花蕾（キク、バラ）などに潜り込みます。幼虫による食害が発生していないかよく観察して、初期防除に努めます。
- オオタバコガは広食性で様々な作物を加害します。この時期にはほとんど発生しなかった豆類やイチゴ、果樹などでも発生する可能性があります。

- (3) 病害虫防除所で実施した薬剤感受性検定では、近年の感受性低下は確認されていません。発生が見られた場合は、表を参考に薬剤を選択してください。使用にあたっては、品目毎の登録内容を必ず確認してください。




図. 性フェロモントラップ誘殺数の推移 (桜井市池之内)

表. オオタバコガに対する殺虫効果が期待される薬剤

IRACコード	商品名
5	スピノエース顆粒水和剤、ディアナSC
6	アフーム乳剤、アニキ乳剤、アグリメック
18	ファルコンフロアブル
22A	トルネードエースDF
22B	アクセルフフロアブル
28	フェニックス顆粒水和剤、プレバソンフロアブル ベネビアOD、ヨーバルフロアブル
30	グレーシア乳剤、ブロフレアSC
UN	プレオフロアブル

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所 TEL. 0744-47-4481

その他関連情報は以下をご覧ください

病害虫防除所/奈良県公式ホームページ

<http://www.pref.nara.jp/1557.htm>

奈良県農薬情報システム (農作物病害虫・雑草防除指導指針)

<http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nara>