

## 地域の特徴

地域名	地域の特徴	所属市郡名	作付品種
平坦地区	1. 地勢：奈良盆地にあたる地帯 2. 標高：40～100m 3. 気象（5月～10月）： イ. 最高気温 28.0 ロ. 最低気温 17.2 ハ. 降水量 950mm 4. 地質・土性：沖積層、壤土～砂壤土 排水やや不良、北部に湿田多い 5. 栽培環境： 都市近郊地帯、園芸作物の栽培多い 6. 障害：汚水害、紋枯病、白葉枯病	奈良市 大和郡山市 天理市 大和高田市 桜井市 橿原市 磯城郡 北葛城郡北部	キヌヒカリ ヒノヒカリ 旭糯
西部中間地区	1. 地勢：生駒・金剛葛城山系の東麓地帯 2. 標高：80～200m 3. 気象（5月～10月）： イ. 最高気温 27.0 ロ. 最低気温 16.5 ハ. 降水量 1500mm 4. 地質・土性：花崗岩、砂壤土～壤土 漏水田多い 5. 栽培環境： 都市近郊地帯、園芸作物の栽培多い 6. 障害：下葉枯、いもち病、ごま葉枯病	生駒市 御所市 香芝市 葛城市 生駒郡	キヌヒカリ ヒノヒカリ 旭糯
南部中間地区	1. 地勢：奈良盆地南部山間及び吉野川階段地 2. 標高：100～300m 3. 気象（5月～10月）： イ. 最高気温 28.0 ロ. 最低気温 16.5 ハ. 降水量 1,450mm 4. 地質・土性：主に沖積層、砂壤土 漏水田多い 5. 栽培環境：一毛作田多い 6. 障害：下葉枯、いもち病、紋枯病	五條市 高市郡 吉野郡北西部	キヌヒカリ ヒノヒカリ 旭糯
大和高原地区	1. 地勢：大和高原地帯 2. 標高：300～500m 3. 気象（5月～10月）： イ. 最高気温 24.5 ロ. 最低気温 13.7 ハ. 降水量 1,200mm 4. 地質・土性：洪積層、壤土～埴壤土 5. 栽培環境：一毛作田多い 6. 障害：いもち病、白葉枯病	山辺郡 奈良市山間 天理市山間 桜井市山間	あきたこまち ひとめぼれ コシヒカリ ヒノヒカリ ココノエモチ
宇陀・ 吉野山間地区	1. 地勢：宇陀盆地と山間部の渓谷 2. 標高：300～600m 3. 気象（5月～10月）： イ. 最高気温 25.6 ロ. 最低気温 14.9 ハ. 降水量 1,360mm 4. 地質・土性：花崗岩、沖積層、砂壤土 5. 栽培環境：一毛作田多い 6. 障害：いもち病、冷水害	五條市山間 宇陀市 宇陀郡 吉野郡東部 吉野郡南部	あきたこまち ひとめぼれ コシヒカリ ヒノヒカリ ココノエモチ