

< 水稻の生育 >

(1) ヒノヒカリ 場所：橿原市四条町（平坦部）

	4 月		5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月																				
	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																		
水 稻 の 生 育 (草丈 稈長 穂長 茎数)			播 出 緑 種 芽 化 期 期 期			硬 化 期	田 植 植 え 期		分 げ つ 期			最 高 分 げ つ 期			穂 首 分 化 期			幼 穂 形 成 期			減 穂 出 数 ば ら 分 裂 み 期 期			穂 揃 期			乳 穂 熟 期			糊 穂 熟 期			黄 穂 熟 期			成 熟 期		
																							草 丈 - 100 cm 稈 長 - 80 cm 茎 数 (穂 数) - 60 30 穂 長 - 40 20 - 20 10 - 0 0 0															
主 な 作 業	苗 床 づ くり		床 土 準 備			種 籾 準 備			塩 種 種 水 子 ま 選 消 き 毒			元 代 田 除 肥 か 植 草 施 用 き え 剤 用			中 干 し			穂 (穂 肥 1 肥 施 回 施 用 目 回 用 目)			落 水			収 穫														
水 管 理						や や 深 水			浅 水			中 干 し			間 断 か ん 水			浅 水			間 断 か ん 水			落 水														
病 害 虫 防 除	() 書 き は、発 生 の 多 い と き に 防 除。		籾 枯 病 ば ね か ま も 細 シ 苗 葉 ち 菌 ン 病 枯 病 病 ガ 病 レ セ ン チ ユ ウ			(ヒイ 苗 メネ 立 トミ 枯 ビズ 病 ウゾ ンウ カム シ)			(イネ ミ ズゾ ウム シ)			(ヒニセ メカジ トメロ ビイウ ウチン ヌカウ)			イウ 紋 ネン 枯 ツカ 病 ト類 ム シ			穂 い も ち			穂 ニ ト い カ ビ も メ イ ち イ ロ チ ウ ユ ン ウ カ			(穂 い も ち)			(カ メ ム シ 類)			ト ビ イ ロ ウ ン カ								

(2)ひとめぼれ

場所：宇陀市榛原区三宮寺（山間部）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
水稲の生育 (草丈 稈長 穂長 茎数)	播種期 出芽期 緑化期 硬化期			田植え期			分けつ期			最高分げつ期 幼穂形成期 穂ばらみ期 減数分裂期			穂揃期 乳熟期 糊熟期 黄熟期			成熟期 草丈			草丈 稈長 cm 500 400 300 200 100 0	
主な作業	種まき 塩水まき 種選り 床土準備 種消毒			元肥 代かき 田植え 除草剤施用						中干し 穂肥1施用目 穂肥2施用目			落水			収穫				
水管理				やや深水			浅水			中干し 間断かん水 深水			間断かん水 落水							
病害虫防除	()書きは、発生が多いと 防除。			(イネミズゾウムシ) 苗立枯病 (イネミズゾウムシ)			(イネミズゾウムシ)			(イネミズゾウムシ)			(イネミズゾウムシ)			(イネミズゾウムシ)				