

香川県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(2例目)！

本日 香川県東かがわ市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認。

◆ 発生農場:香川県東かがわ市 採卵鶏農場 飼養羽数:約4万8千羽


7日、死亡羽数が増加しているとの通報があり、インフルエンザ簡易検査を行い、陽性を確認。遺伝子検査の結果H5亜型であり、疑似患畜であることが決定。

鳥インフルエンザを疑う症状があれば、 すぐに連絡を！

- 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が最近の21日間の平均死亡率の2倍以上となった場合
- 5羽以上の家きんがまとまって死亡している場合
- 複数の鶏の「とさか」などが青っぽくなり、元気なく、産卵率が低下

農場出入口での消毒の徹底、家きん舎ごと専用の靴の設置および使用、野生動物の農場への侵入防止(ネット等の設置・点検および修繕)、家きんの飲み水の適切な消毒等、飼養衛生管理基準の遵守を徹底し、より慎重な健康観察をお願いします。

高病原性鳥インフルエンザ対策に…




定期的に消石灰を散布しましょう！！

消石灰は、ぬれて乾燥すると効果が低下してしまいます。
下記の消石灰散布方法を参考に、定期的に散布してください。

<消石灰の散布方法>

- ・鶏舎周辺、農場内道路や通路、農場敷地周縁：2～3m幅
- ・散布量：1kg／1m²
→ 消石灰1袋(20kg)で20m²



農場敷地

奈良県家畜保健衛生所

業務第一課 TEL:0743-59-1700 FAX:0743-59-1740

業務第二課 TEL:0745-62-2440 FAX:0745-62-8771